

INLYTA®

Axitinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par les médecins hospitaliers spécialistes en oncologie médicale ou en cancérologie. Inlyta® est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUE

Quatre dosages sont disponibles sous plaquettes thermoformées de 14 comprimés pelliculés, en boîte de 56 :

- 1 mg, comprimés rouges et ovales
- 3 mg, comprimés rouges et ronds
- 5 mg, comprimés rouges et triangulaires
- 7 mg, comprimés rouges et en losange

A conserver à température ambiante

POSOLOGIE

La posologie usuelle est de **5 mg deux fois par jour**, mais elle peut varier, selon la tolérance individuelle au traitement, entre 2 et 10 mg deux fois par jour.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhée	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, les bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, contactez votre médecin.
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.
Fatigue inhabituelle Céphalées	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles. Céphalées : attention à l'effet conjoint avec l'alcool. Évitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion.	En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
Nausées et vomissements	Buvez entre les repas. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Saignements	Utilisez une brosse à dent souple. Évitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.

Myalgies, crampes	Reposez-vous souvent et faites des exercices légers (marche).	Parlez en à votre médecin des médicaments symptomatiques peuvent vous être prescrits.
Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Évitez le soleil et toute exposition à la chaleur. Évitez les vêtements et les chaussures trop serrées. Utilisez un savon doux sans parfum. Évitez les tâches ménagères et les travaux irritants pour les mains. Évitez la station debout et les marches prolongées. Évitez les pansements adhésifs.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds, contactez immédiatement votre médecin. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes (voir avec votre médecin).

Possibles modification du goût, de la voix et perte d'appétit.

Avant l'instauration du traitement et périodiquement pendant toute la durée de celui-ci, votre fonction thyroïdienne, l'hémoglobine, l'hématocrite, votre fonction rénale (protéinurie) et votre fonction hépatique seront contrôlées.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



Les comprimés d'INLYTA® se prennent entiers (ni écrasés, ni coupés), **avec un grand verre d'eau, 2 fois par jour, à intervalles d'environ 12 heures, au cours ou en dehors des repas.**



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'Inlyta® ou en cas de vomissement, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante au moment habituel et notez l'oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Ne pas prendre INLYTA® en cas de grossesse et d'allaitement. Pour les femmes en âge de procréer, une contraception efficace doit être mise en place pendant toute la durée du traitement et jusqu'à une semaine après l'arrêt du celui-ci.



Ne consommez pas de pamplemousse, de jus de **pamplemousse**, ni de tisane au **millepertuis** pendant le traitement.



En cas d'intervention chirurgicale programmée, informez votre médecin.



Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



Ne jetez pas les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapporter les à votre pharmacien.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.

En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Contactez rapidement le médecin en cas :

- d'apparition de selles noires, de saignements du nez et de crachats comportant du sang,
- de gonflement, rougeur, douleur au niveau d'un membre, de difficultés à respirer ou de toux anormale,
- de confusion, de troubles visuels et du comportement,
- de maux de tête inhabituels, de palpitations et de bourdonnements d'oreille.
- douleurs abdominales intenses
- coloration jaune de la peau et du blanc des yeux, urine foncée, confusion et/ou désorientation