

# NEXAVAR®

Sorafénib

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

## PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées :

- boîte de 112 comprimés pelliculés ronds et rouges dosés à 200 mg.

A conserver à température ambiante, ne dépassant pas 25°C.

## POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle. La dose habituelle chez l'adulte est de **2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir**, c'est à dire 4 comprimés par jour.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

## PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Rougeur, démangeaisons	Utilisez une crème hydratante. Portez des vêtements amples et lâches. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Evitez le soleil et toute exposition à la chaleur. Evitez les vêtements et les chaussures trop serrées. Utilisez un savon doux sans parfum. Evitez les tâches ménagères et les travaux irritants pour les mains. Evitez la station debout et les marches prolongées.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds, contactez immédiatement votre médecin. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes (voir avec votre médecin).

Hypertension artérielle	Vérifiez régulièrement la tension artérielle	Consultez le médecin en cas d'élévation de la tension artérielle.
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Saignements (diminution des plaquettes)		Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Fatigue inhabituelle	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

## CONSEILS AUX PATIENTS



Il est recommandé d'administrer le NEXAVAR® **en dehors des repas ou avec un repas pauvre ou modérément riche en graisses**. En cas de repas riche en graisses, les comprimés de NEXAVAR® doivent être pris au moins 1 heure avant ou 2 heures après le repas. Les comprimés doivent être avalés avec un **verre d'eau**. Respectez un intervalle de 12 heures entre la prise du matin et celle du soir.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas laisser à portée des enfants.



**Eviter les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac. Demandez conseil à votre pharmacien.**



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



**Si vous avez oublié de prendre une dose de Nexavar®,** prenez la dose suivante à l'heure habituelle mais ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée. Noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Informez immédiatement votre médecin si vous avez pris plus de comprimés que la dose prescrite.



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



Ne pas prendre NEXAVAR® pendant la grossesse et l'allaitement. Utilisez une méthode de contraception pendant toute la durée du traitement



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



### **Contactez rapidement le médecin en cas de :**

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang
- gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds
- douleur thoracique, en particulier si elle survient pendant un exercice.