

XTANDI®

Enzalutamide

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Un seul dosage est disponible par boîte de 112 capsules molles sous plaquettes thermoformées de 28 capsules :

- 40 mg, capsule blanche à blanc cassé

A conserver à température ambiante.

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle et vous sera expliquée par votre médecin.

La posologie usuelle d'enzalutamide est de **160 mg (4 capsules de 40 mg)** en une prise orale journalière unique, **pendant ou en dehors des repas**.

Les capsules molles ne doivent pas être croquées, ni mâchées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets secondaires	Prévention	Conduite à tenir
Bouffées de chaleur	Evitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur.	Bien s'hydrater. Restez au frais. Portez des vêtements légers.
Maux de tête, fatigue	Reposez-vous souvent et faites des exercices légers (marche).	Prudence en cas de conduite de véhicule.
Maux de tête, palpitations	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice. Limitez votre consommation de sel et d'alcool	Contactez votre médecin si ces signes surviennent.
Sécheresse cutanée, prurit	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil et utilisez une protection solaire (chapeau, écran total)	Une crème hydratante permet de soulager les symptômes.



Convulsions, risque de convulsions : Arrêtez de prendre l'enzalutamide et consultez immédiatement votre médecin.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



- Les capsules de XTANDI® sont à avaler **entières** (ni brisées, ni mâchées) par voie orale, **avec un verre d'eau, pendant ou en dehors des repas**, de préférence à heure fixe.



- **Si vous avez oublié de prendre vos capsules d'Xtandi®**, ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et notez cet oubli dans le carnet de suivi. **En cas de vomissement après une prise, ne reprenez pas la prise.**



- **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**



- Ne prenez pas Xtandi® pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Si vous avez des rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être, vous devez utiliser un préservatif **ET** une autre méthode efficace de contraception, cela **pendant le traitement et durant 3 mois après l'arrêt du traitement.**



- Evitez de consommer des pamplemousses ou du jus de pamplemousse pendant le traitement.



- Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



- Ne jetez pas les emballages, ni les capsules dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- convulsions
- insuffisance cardiaque
- toux
- gonflement des membres
- prise de poids