

ZYTIGA®

Acétate d'Abiratéronne

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUE

Une seule présentation est disponible :

- Flacon de 120 comprimés ovales blancs dosés à 250 mg.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas conserver au réfrigérateur.

POSOLOGIE

La dose quotidienne recommandée est de 1g, soit **4 comprimés en une seule prise**, en association avec 10 mg par jour de prednisone ou prednisolone administrée par voie orale.

Les comprimés de ZYTIGA® **ne doivent pas être pris avec de la nourriture**.

En cas d'oubli d'une prise, il convient de reprendre le traitement le lendemain à la dose quotidienne.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets secondaires	Prévention	Conduite à tenir
Rétention d'eau et oedèmes	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez votre poids. En cas de prise de poids rapide et inattendue, contactez votre médecin
Infection urinaire	Buvez suffisamment	Surveillez votre température. En cas de signes infectieux (fièvre, frissons, douleurs) prévenez votre médecin
Augmentation des graisses dans le sang	Faites contrôler votre taux de graisse dans le sang avant de débiter le traitement	Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin

Augmentation des tests de la fonction hépatique	Un contrôle de la fonction hépatique sera réalisé avant de débiter le traitement	Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin
Complications cardiaques, augmentation de la pression artérielle	Un traitement préventif pourra être choisi par le médecin en fonction du risque	Consultez le médecin en cas de survenue de symptômes tels qu'essoufflement, douleur thoracique, gonflement des bras ou jambes

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS



Les comprimés sont à avaler **entiers** (ni brisés, ni mâchés) par voie orale, avec un verre d'eau, en dehors des repas : **prenez votre médicament au moins deux heures après le repas et ne mangez rien pendant au moins une heure**



Ce médicament contient du lactose



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Si vous avez oublié une prise de ZYTIGA®, prenez votre dose normale le lendemain, sans la doubler. Si vous oubliez de prendre le ZYTIGA pendant plus d'un jour, prévenez votre médecin sans délai.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez des rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être, vous devez utiliser un préservatif ET une autre méthode efficace de contraception. Les femmes enceintes, allaitant ou susceptibles d'être enceinte doivent porter des gants si elles ont à toucher ou manipuler le ZYTIGA®.



ZYTIGA® est un nouveau médicament. Soyez vigilant en cas d'effets indésirables et informez votre médecin ou votre pharmacien.



Contactez rapidement le médecin et arrêtez de prendre le ZYTIGA® en cas de :

- Faiblesse musculaire, contractions musculaires
- Forts battements du cœur (palpitations)